

低血糖症急救包使用說明書

功用：急救因胰島素過多所致之重度低血糖症。

升糖素使用時機：當發生低血糖意識不清，無法自行進食或低血糖昏迷時使用。

組成：低血糖症急救包內含有：

升糖素(Glucagon 1 mg) (白色粉末，橘色瓶蓋)	1 瓶	
稀釋液 (1 mL) (透明的水，白色瓶蓋)	1 瓶	
1 cc 或 2~3 cc 注射空針附針頭	1 支	
酒精棉	數片	
本使用說明書	1 份	

學生：_____

- 使用程序：
1. 用酒精棉消毒升糖素和稀釋液藥瓶的橡皮蓋
 2. 用注射空針抽取 1cc (mL) 的稀釋液
 3. 將 1cc (mL) 的稀釋液注入升糖素的瓶內，充分混合均勻
 4. 抽出升糖素藥水 _____ cc(mL)
 5. 注射在大腿外側肌肉或上臂肌肉內 (肌肉注射)
 6. 按摩注射部位 1 分鐘

說明：1. 糖尿病友最怕的是低血糖症。我們除了要預防外，必須早期發現並馬上處置，否則他們將會有生命危險。重度低血糖症時，可能會昏迷，甚至抽搐(抽筋)。這時請馬上注射升糖素於上臂或大腿肌肉內，然後按摩注射部位，並立即送醫診治和測量血糖。注射完通常可在數分鐘內醒來。

2. 注射劑量：

升糖素(glucagon 1 mg/vial)

體重 (kg)	劑量 (mg)
小個子 (< 30 kg)	0.5 (0.5 mL= 半支)
大個子 (> 30 kg)	1.0 (1.0 mL= 1 支)

3. 必須全家人都會使用急救包而且知道放置的地方
4. 有任何疑問，請立即與您的醫師聯絡

林口長庚醫院 兒童內分泌科 _____ 醫師：(03)3281200 分機 8969
 兒童糖尿病衛教室 謝鳳如衛教師 (03)3281200 分機 8232