

昇糖精醫囑

林口長庚醫院兒童內分泌科

姓名：_____ 性別：男、女 年齡：_____歲 體重：_____ Kg

昇糖精醫囑 (Glucagen order)

類別	藥品名稱	劑量	用法	途徑
Stat	Glucagen(biosynthetic)	1mg(liu)/kit	_____mg	PRN IM

當低血糖合併意識改變時(if hypoglycemia with conscious change)

<升糖精醫囑期限> 開始：_____年_____月_____日，結束：_____年_____月_____日

昇糖精(GlucaGen)內容物



升糖素(1 mg)(橘色蓋子) 1 瓶
稀釋液(1 mL)(白色蓋子) 1 瓶

其他尚需：
酒精棉片 1 片
1cc 空針 1 支

昇糖精使用程序

1. 用酒精棉消毒升糖素和稀釋液藥瓶的橡皮蓋
2. 用注射空針抽取 1cc 的稀釋液
3. 將 1cc 的稀釋液注入升糖素瓶內，充分混合均勻
4. 抽出升糖素藥水 _____cc(mg)
5. 注射在大腿外側肌肉或上臂肌肉內（肌肉注射）
6. 按摩注射部位 1 分鐘

說明：糖尿病病友最怕的是低血糖症。我們除了要預防外，必須早期發現並馬上處置，否則他將會有生命危險。重度低血糖症時，他可能會昏迷，甚至抽搐(抽筋)。這時請馬上給他注射升糖素於上臂或大腿肌肉內，然後按摩注射部位，他通常可在數分鐘內醒來。若無法恢復意識請立即送醫診治和測量血糖。

聯絡方式(上班時間：W1~W5 8:30-16:30)

林口長庚兒童內分泌科 (03) 3281200 分機 8969 _____ 醫師

兒童糖尿病衛教室 (03) 3281200 分機 8232 謝鳳如 衛教師