



# 減痛內視鏡檢查 與輕中度鎮靜

## ● 何謂減痛內視鏡檢查

即是在內視鏡檢查開始前，利用超短效之止痛鎮靜類藥物，達到最輕度鎮靜(減輕焦慮)的半清醒狀態，於檢查時提高受檢者對疼痛忍受度、身心放鬆，但又不像手術時的深度麻醉狀態。在醫療團隊全程監控下，提供接受內視鏡檢查之顧客，一個安全、舒適、消除疼痛及恐懼之新醫療服務項目。



## ● 減痛內視鏡檢查的禁忌

- 一、年齡限制：20歲(含)以上~60(含)歲以下
- 二、躁動、不合作或意識不清者
- 三、最近三個月有急心肌梗塞、嚴重心肺疾病史或心電圖有特殊異常變化者
- 四、曾有主動脈瘤或主動脈剝離病史
- 五、正值氣喘發作期和嚴重心衰竭者
- 六、最近六個月內曾接受重大手術者  
(如:心、肺、腹部手術)

七、腎臟功能異常不適合補充大量水分者

八、其他：懷孕、發燒或重大感染中、凝血功能障礙、癲癇治療、失眠或憂鬱症治療、藥物過敏史

九、有長期飲酒習慣  
(一個月以上，每週至少2天以上者)

十、長期服用安眠藥物

十一、長期服用憂鬱症藥物

## ● 減痛內視鏡檢查的過程及步驟

### 檢查開始前

需配合禁食時間，且完成心電圖、胸部X光等檢查，由胃腸科醫師評估受檢者身體狀況，詢問有無藥物過敏等病史。

### 準備檢查時

接上基本生命監視系統，如自動血壓計、心電圖及血氧飽和濃度監測器等，然後由靜脈注射鎮靜藥物，使達到輕中度鎮靜(半清醒)狀態

### 完成檢查後

至恢復室觀察休息

## ● 併發症及副作用

減痛內視鏡雖然只有輕度鎮靜的半清醒狀態，因使用的藥物仍是鎮靜藥品，極少數會有因鎮靜麻醉發生吸入性肺炎或死亡案例，靜脈麻醉藥的合併症包含：呼吸抑制、心肺功能變差、低血氧、低血壓、心搏過慢等，其發生率約千分之一左右。另外仍有少部分受檢者會有麻醉後頭暈、嗜睡、噁心及嘔吐等，所以請您檢查後24小時勿開車，並須有家屬陪同您檢查。