

## COLONFIBERSCOPY 醫囑模組

### \*\*\*Niflec powder 1 包\*\*\*\*

1. COLONFIBERSCOPY (適應症：下消化道症狀超過 1 個月，如：腹瀉、腹痛、大便習慣改變、診斷不明確者)
2. Peg 4000 +electrolytes powder(Niflec powder) 137.15g/sachet **1PK ONCE** PC PO (\$自費：250 元/包) 檢查用藥 FOR COLONFIBERSCOPE)
3. 檢查前二天開始低渣飲食
4. 便秘評估 1 分以上，請開立 Bisacodyl 5mg/tab 2# PO ONCE
5. Peg 4000 + electrolytes powder (Niflec powder) **1PK**，每包 PEG 泡在 2000CC 冷開水，1000CC 檢查前一天晚上喝，1000CC 檢查當天早上喝。

### \*\*\*Niflec powder2 包\*\*\*\*

1. COLONFIBERSCOPY (適應症：長期嚴重便秘、限水病人、腎功能不全(透析患者)、肝硬化、心衰竭或其它診斷不明確者)
2. Peg 4000 +electrolytes powder(Niflec powder) 137.15g/sachet **2PK ONCE** PC PO (\$自費:250 元/包) 檢查用藥 FOR COLONFIBERSCOPY)
3. 檢查前二天開始低渣飲食
4. 便秘評估 1 分以上，請開立 Bisacodyl 5mg/tab 2# PO ONCE
5. Peg 4000 + electrolytes powder (Niflec powder) **2PK**，每包 PEG 泡在 2000CC 冷開水，一包檢查前一天晚上喝，一包檢查當天早上喝

### \*\*\*Bowklean Powder 2 包\*\*\*\*

1. COLONFIBERSCOPY (適應症：下消化道症狀超過 1 個月，如：腹瀉、腹痛、大便習慣改變、診斷不明確者)
2. Bowklean Powder **2 包** (\$自費：290 元/包) 檢查用藥 FOR COLONFIBERSCOPY)
3. 檢查前二天開始低渣飲食
4. 便秘評估 1 分以上，請開立 Bisacodyl 5mg/tab 2# PO ONCE
5. Bowklean Powder，每包 Bowklean Powder 泡 150CC 冷開水，攪拌約 5 分鐘完全溶解後立即喝完，一包檢查前一天晚上喝，一包檢查當天早上喝