

長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院

麻醉科系

適用對象(麻醉科系護理師)

<手術室搬運病患>  
標準操作規範

編號：AUNQ01-201-A34

中華民國 88 年 07 月 01 日 制訂公佈

中華民國 107 年 08 月 25 日 第 12 次修訂

## 使 用 規 定

- 一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。
- 二、倘若對所訂內容有疑問，應即向直屬主管請教，務必求得徹底瞭解為止。
- 三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更為完整。

## 目 錄

壹、工作職責

貳、操作標準

參、異常狀況及處理對策

## 壹、工作職責

總頁數：10

頁數：10-1

### 一、工作目的

- (一)、為確保病患安全，避免跌落受傷及減少工作人員職業傷害。

### 二、工作項目

#### (一)、麻醉前：

1. 意識清醒可自行移動之病患。
2. 意識清醒但無法自行移動之病患。
3. 意識不清之病患。

#### (二)、麻醉中：

1. 所有麻醉中之病患。

#### (三)、麻醉後：

1. 麻醉已甦醒可自行移動之病患。
2. 麻醉已甦醒但無法自行移動之病患。
3. 麻醉未甦醒之病患。

## 貳、操作標準

編號：AUNQ01-201-A34

總頁數：10

頁數：10-2

項目	細目	管制基準	操作說明	注意事項	異常處理
壹、			<p>麻醉前：</p> <p>一、開刀房護理師將病患推入手術室後，意識清醒可自行移動之病患。</p> <p>(一)搬運病患前，應先向病人說明。</p> <p>(二)將推床緊靠手術台，把推床之固定輪固定好。</p> <p>(三)放下床欄。</p> <p>(四)護理人員及麻醉人員共同協助病患移至手術台上</p> <p>二、意識清醒但無法自行移動之病患。</p> <p>(一)搬運病患前，應先向病人說明。</p> <p>(二)將推床緊靠手術台，把推床之固定輪固定好。</p> <p>(三)放下床欄。</p> <p>(四)使用「搬運病患滑板」將</p>	<p>1.應先行丈量管線之安全長度，注意勿拉扯病患身上各種管線，如 IV. Line、導尿管等。Chest tube 須先正壓後以管夾夾住，才可移動 Bottle。</p> <p>2.注意病患之適當體位，避免關節、神經受壓迫而受傷。</p> <p>3.搬動老年人須動作輕柔預防因骨質疏鬆，用力過大而骨折。</p> <p>4.搬運時至少需要三人，一人站在手術台對側，一人站在推床旁，麻醉護理師站頭位。</p> <p>1. 應先行丈量管線之安全長度，注意勿拉扯病患身上各種管線，如 IV. Line、導尿管等。Chest tube 須先正壓後以管夾夾住，才可移動 Bottle。</p> <p>2.注意病患之適當體位，</p>	
			公佈日期：88 年 07 月	修訂日期：107 年 8 月 第 12 次修訂	

## 貳、操作標準

編號：AUNQ01-201-A34

總頁數：10

頁數：10-3

項目	細目	管制基準	操作說明	注意事項	異常處理
			<p>病患移至手術台，須有 3-4 人操作。</p> <p>三、意識不清且躁動不安之病患，或有病患疼痛難以忍受的情況。</p> <p>(一)先給予麻醉。</p> <p>(二)將推床緊靠手術台，把推床之固定輪固定好。</p> <p>(三)放下床欄。</p> <p>(四)使用「搬運病患滑板」將病患移至手術台，須有 4 人操作。</p>	<p>避免關節、神經受壓迫而受傷。</p> <p>3.搬動老年人須動作輕柔預防因骨質疏鬆，用力過大而骨折。</p> <p>4. 搬運時至少需要 3-4 人，一人站在手術台對側，一人站在推床旁。一人搬運下肢，麻醉護理師站頭位，隨著翻轉、固定頭部、保護頸椎。</p> <p>1. 應先行丈量管線之安全長度，注意勿拉扯病患身上各種管線，如 IV. Line、導尿管等。Chest tube 須先正壓後以管夾夾住，才可移動 Bottle。</p> <p>2.注意病患之適當體位，避免關節、神經受壓迫而受傷。</p> <p>3.搬動老年人須動作輕柔預防因骨質疏鬆，用力過大而骨折。</p> <p>4. 搬運時至少需 4 人，一人站在手術台對側，一人站在推床旁，一人站在下肢，麻醉護理師站頭位。</p>	
公佈日期：88 年 07 月				修訂日期：107 年 8 月 第 12 次修訂	

## 貳、操作標準

編號：AUNQ01-201-A34

總頁數：10

頁數：10-4

項目	細目	管制基準	操作說明	注意事項	異常處理
貳、			<p>麻醉中：</p> <p>一、當進行搬運時需要有 4 人以上才能實施，人員配置於病患左右兩邊及頭腳。</p> <p>二、工作人員需維持正常位姿，以避免職業傷害。</p> <p>三、因手術方式需要，由外科醫生、護理人員及麻醉人員共同協助變更合適的手術姿勢。</p> <p>四、先移除病患身上各種監視器之管線，如血壓管線、Pulse Oximeter 管線等。</p> <p>五、必須注意麻醉中手術床之變動，如上升、斜側、頭低、...時之移位。</p> <p>六、全身麻醉之病患插氣管內管，特別固定好，以免滑落。</p> <p>麻醉後：</p> <p>一、麻醉清醒後將推床或病床緊靠手術台。</p> <p>二、將推床輪子予以固定。</p> <p>三、視需要給予病患保護性約束。</p>	<p>1. 應先行丈量管線之安全長度，注意勿拉扯病患身上各種管線，如 IV. Line、E.K.G.線、導尿管等。</p> <p>2. 注意病患之適當體位，避免關節、神經受壓迫而受傷。</p> <p>3. 當手術姿勢改變時應注意是否有支點受壓及保護支點之設備，如枕頭、抗壓墊等。</p> <p>4. 俯臥的病人要注意眼睛、耳朵是否受壓。</p>	
參、				<p>1. 注意病患之適當姿勢，避免關節、神經受壓迫而受傷。</p> <p>2. 應先行丈量管線之安全長度，注意病患身上各種管線，</p>	
			公佈日期：88 年 07 月	修訂日期：107 年 8 月 第 12 次修訂	

## 貳、操作標準

編號：AUNQ01-201-A34

總頁數：10

頁數：10-5

項目	細目	管制基準	操作說明	注意事項	異常處理
			<p>四、使用「搬運病患滑板」將病患移至推床或病床上。</p> <p>五、拉起床欄避免跌落。</p> <p>六、搬運過程中動作應輕巧小心，以減少病患傷口之疼痛。</p> <p>七、若有 IVAC 時，請將 IVAC 機座朝外，以免鬆脫落下直擊病人。</p>	<p>如 IV. Line、E.K.G.線、導尿管等。</p> <p>3. 注意病患身上各種管線，如 IV. Line、導尿管、引流管等，避免牽扯脫落。</p> <p>4. 至少要有 4 人協助搬運病患。</p>	
			公佈日期：88 年 07 月	修訂日期：107 年 8 月 第 12 次修訂	



作業目的	適用範圍	使用器材、工具
<p>一、為確保病患安全，避免跌落受傷及減少工作人員職業傷害。</p>	<p>S53-001~S53-720</p> <p>一、麻醉前：                      (一)意識清醒可自行移動之病患。                      (二)意識清醒但無法自行移動之病患。                      (三)意識不清之病患。</p> <p>二、麻醉中：                      (一)所有麻醉中之病患。</p> <p>三、麻醉後：                      (一)麻醉已清醒可自行移動之病患。                      (二)麻醉已清醒但無法自行移動之病患。                      (三)麻醉未清醒之病患。</p>	<p>一、推床或病床-----1 床</p> <p>二、手術台-----1 台</p> <p>三、搬運病患滑板-----1 張</p>
		<p>公佈日期：88 年 07 月 修訂日期：107 年 8 月 第 12 次修訂</p>

總頁數：10

頁數：10-7

項次	操作說明或作業流程	注意事項
壹、	<p>麻醉前：</p> <p>一、開刀房護理師將病患推入手術室後，意識清醒可自行移動之病患。</p> <p>(一)搬運病患前，應先向病人說明需移動的原因。</p> <p>(二)將推床緊靠手術台，把推床之固定輪固定好。</p> <p>(三)放下床欄。</p> <p>(四)護理人員及麻醉人員共同協助病患移至手術台上</p> <p>二、意識清醒但無法自行移動之病患。</p> <p>(一)搬運病患前，應先向病人說明需移動的原因。</p> <p>(二)將推床緊靠手術台，把推床之固定輪固定好。</p> <p>(三)放下床欄。</p> <p>(四)使用「搬運病患滑板」將病患移至手術台，須有3-4人操作。</p> <p>三、意識不清且躁動不安之病患或病患疼痛難以忍受的情況。</p> <p>(一)先給予麻醉。</p> <p>(二)將推床緊靠手術台，把推床之固定輪固定好。</p> <p>(三)放下床欄。</p> <p>(四)使用「搬運病患滑板」將病患移至手術台，須有4人操作。</p>	<p>1.應先行丈量管線之安全長度，注意勿拉扯病患身上各種管線，如 IV. Line、導尿管等。Chest tube 須先正壓後以管夾夾住，才可移動 Bottle。</p> <p>2.注意病患之適當體位，避免關節、神經受壓迫而受傷。</p> <p>3.搬動老年人須動作輕柔預防因骨質疏鬆，用力過大而骨折。</p> <p>4.搬運時至少需要 2-3 人，一人站在手術台對側，一人站在推床旁，麻醉護理師站頭位。</p> <p>1. 應先行丈量管線之安全長度，注意勿拉扯病患身上各種管線，如 IV. Line、導尿管等。Chest tube 須先正壓後以管夾夾住，才可移動 Bottle。</p> <p>2.注意病患之適當體位，避免關節、神經受壓迫而受傷。</p> <p>3.搬動老年人須動作輕柔預防因骨質疏鬆，用力過大而骨折。</p> <p>4. 搬運時至少需要 3-4 人，一人站在手術台對側，一人站在推床旁一人搬運下肢，麻醉護理師站頭位。</p> <p>1. 應先行丈量管線之安全長度，注意勿拉扯病患身上各種管線，如 IV. Line、導尿管等。Chest tube 須先正壓後以管夾夾住，才可移動 Bottle。</p> <p>2.注意病患之適當體位，避免關節、神經受壓迫而受傷。</p> <p>3.搬動老年人須動作輕柔預防因骨質疏鬆，用力過大而骨折。</p> <p>4. 搬運時至少需 4 人，一人站在手術台對側，一人站在推床旁，一人站在下肢，麻醉護理師站頭位。</p>
公佈日期：88 年 07 月		修訂日期：107 年 8 月 第 12 次修訂

總頁數：10

頁數：10-8

項次	操作說明或作業流程	注意事項
貳、          參、	麻醉中： 一、當進行搬運時需要有 4 人以上才能實施，人員配置於病患左右兩邊及頭腳。 二、工作人員需維持正常位姿，以避免職業傷害。 三、因手術方式需要，由外科醫生、護理人員及麻醉人員共同協助變更合適的手術姿勢。 四、先移除病患身上各種監視器之管線，如血壓管線、Pulse Oximeter 管線等。 五、麻醉中必須注意手術床之變動，如上升、斜側、頭低、...時之移位。 六、全身麻醉之病患插氣管內管，特別固定好，以免滑落。  麻醉後： 一、麻醉清醒後將推床或病床緊靠手術台。 二、將推床輪子予以固定。 三、視需要給予病患保護性約束。 四、使用「搬運病患滑板」將病患移至推床或病床上。 五、拉起床欄避免跌落。 六、搬運過程中動作應輕巧小心，以減少病患傷口之疼痛。 七、若有 IVAC 時，請將 IVAC 機座朝外，以免鬆脫落下直擊病人。	1. 應先行丈量管線之安全長度，注意勿拉扯病患身上各種管線，如 IV Line、E.K.G.線、導尿管等。 2.注意病患之適當體位，避免關節、神經受壓迫而受傷。 3.當手術姿勢改變時應注意是否有支點及保護支點之受壓處。 4.俯臥的病人要注意眼睛、耳朵是否受壓。          1.注意病患之適當姿勢，避免關節、神經受壓迫而受傷。 2.應先行丈量管線之安全長度，注意病患身上各種管線，如 IV. Line、E.K.G.線、導尿管等。 3.注意病患身上各種管線，如 IV. Line、導尿管、引流管等，避免牽扯脫落。 4.至少要有 4 人協助搬運病患。
公佈日期：88 年 07 月		修訂日期:107 年 8 月 第 12 次修訂

總頁數：10

頁數：10-9

一、「麻醉技術人員工作規範」(2002)長庚醫院。

長庚醫院 麻醉科

公佈日期：88年07月

修訂日期：107年8月 第12次修訂

## 參、異常狀況及處理對策

總頁數：10

頁數：10-10

異 常 狀 況	發 生 原 因	處 理 對 策
<p>一、搬運病患過程中跌落。</p> <p>二、搬運時病患身上各種管線脫落。</p>	<p>(一) 當由手術台搬運病患至推車時，人手不夠。</p> <p>(二) 推車上之固定輪，沒固定好。</p> <p>(三) 病人躁動無法約束</p> <p>搬運病患時，未將身上各種管線移至適當位置或未黏妥置入管路。</p>	<p>1.由手術台搬運病患至推車時，必須要有 4 人同時搬運。</p> <p>2.當要搬運前，必須事先檢查推車之固定輪是否固定。</p> <p>3.需注意事先預防多預備人力幫忙。</p> <p>4.需要時依醫囑給予鎮靜藥物預防跌落。</p> <p>1.將病患身上各種管線，如 IV. Line、E.K.G.線、導尿管等移至適當位置預防拉扯脫落。</p> <p>2.置入病人體內的管路，如 CVP、IVline、Foley 等應栓緊接頭並以 OP SITE 或 3M 膠布貼牢固定。</p>
		<p>公佈日期：88 年 07 月      修訂日期：107 年 8 月 第 12 次修訂</p>