

姓名	Propofol	2% Xylocaine	Fentanyl Alfentanil	IV Extension 3 way	TCI 小可愛	備註
吳紹群	40ml	2ml	Alf 1 ml	1/+	皆可	1. Atropine看台數，有幾台備幾隻 2. 備Dormicum 5pc 3. 若有VIP貴賓，事先詢問是否使用溫點滴或BIS，若需用BIS請提早至材料室借主機及BIS貼片2片；並提醒健診計價人員須多計價S53-133
鹿曉楓	40 ml	2 ml	Alf 1 ml	1/+	小可愛	1. 備 Dormicum 2 pc 2. O ₂ 先給 3. 小可愛架在床上 IV stand 4. 備N/S 500ml+L/R 500ml 各2PC(可能因貴賓抽血檢驗結果更換點滴)
楊雅玲	40 ml	2 ml	Alf 1 ml	1/+	皆可	
黃惠文	40 ml	2.5 ml	Alf 1 ml	1/+	小可愛	1. 備 Dormicum 2 pc 2. 等貴賓麻醉前評估報告全部出來確認可麻醉才On IV 3. 待偵測到 Room air SpO ₂ ，再開始給O ₂ 4. Nasal airway 一定要放置在木櫃或工作車上 5. 3M固定Oral bite全程使用，至病人清醒自行吐出 6. 使用大人 Mask，需要時要扣 Mask，bagging

姓名	Propofol	2% Xylocaine	Fentanyl Alfentanil	IV Extension 3 way	TCI 小可愛	備註
鍾寬智	40 ml	2 ml	Alf 1 ml	1/-	小可愛	1.先給Alf 0.5ml+2% Xylocaine後可自行開始
林坤成	40 ml	2.5 ml	Alf 1 ml	2/+	小可愛	1.備 Dormicum 5 pc · 需要時再抽2.5 ml/0.5 ml
莊馨怡	40 ml	2 ml	Alf 1 ml	1/+	小可愛	1. O ₂ 先給 · 3 L/min 2. 醫師章請從辦公室拿上去 3. 可先詢問是否先給Alf 0.5ml
陳冠宏	40 ml	(備用)2 ml	F 1ml	1/+	小可愛	1.On IV後先給Alf 0.5ml後再側躺擺位
楊千慧	40 ml	2 ml	F 1~1.5ml	1/+	小可愛	1.O ₂ 先給 · 3 L/min 2.確認抽血檢驗報告完整才可ON IV 3.On IV後先給F 0.5ml
施宗孝	40 ml	5 ml	F 1 ml	1/+	小可愛	1. 備 Narcan 1 pc 2. 先 ON IV(無論有無報告) 3. 多備幾支2% Xylocaine
楊勝淳	40 ml	2.5 ml	F 1 ~1.5ml	1/+	小可愛	1.勝淳醫師會將F劑量標註於麻醉同意書後面， 待 ON IV 後可依照Order先給藥
薛媛真	40 ml	2 ml	Alf 1 ml	1/+	小可愛	1.備 Dormicum 2 pc 2.ON IV 後可先給Alf 0.5ml

姓名	Propofol	2% Xylocaine	Fentanyl Alfentanil	IV Extension 3 way	TCI 小可愛	備註
陳治郡	40 ml	2 ml	F 1~1.5ml	1/+	小可愛	1.備 Dormicum 2 pc
侯劭昀	40 ml	2 ml	F 1 ml	1/+	小可愛	1.Propofol 輸注時，全程 IV 關閉，等Propofol stop 後才可開點滴 2.Propofol setting時從5開始 3.3 Way不用先接，劭昀醫師給藥後會自己接 4.劭昀醫師麻醉前會看電腦麻醉評估單，可先開好畫面等待醫師
吳恩博	40 ml	2 ml	Alf 1 ml	1/+	小可愛	1.備 Dormicum 2 pc 2.備N/S 500ml+L/R 500ml 各2PC(可能因貴賓抽血 檢驗結果更換點滴)
張涵臻	40 ml	2 ml	F 1~1.5 ml	1/+	小可愛	1. 備 Dormicum 2 pc 2.ON IV後先給F 0.5ml
謝佳妤	40 ml	2 ml	Alf 1~1.5 ml	1/+	小可愛	1.備 Dormicum 2 pc，先抽一支並將其分抽為5支，佳妤醫師會自行評估貴賓情況給予 2.ON IV 後可先給Alf 0.5ml
陳弘杰	40 ml	2 ml	Alf 1 ml	1/+	小可愛	1.備 Dormicum 2 pc 2.Alfentanil 1ml Dilute 至2ml，ON IV後可先給1ml

姓名	Propofol	2% Xylocaine	Fentanyl Alfentanil	IV Extension 3 way	TCI 小可愛	備註
楊景仲	40 ml	2 ml	Alf 1 ml	1/+	小可愛	1.備 Dormicum 2 pc 2.ON IV後可先給Alf 0.2-0.3ml
黃士聰	40 ml	5 ml	Alf 1~1.5 ml	1/+	小可愛	1.備 Dormicum 2 pc
楊明驥	40 ml	2 ml	F 1 ml	1/+	小可愛	1.備 Dormicum 2 pc 2.確認抽血檢驗報告完整才可ON IV