

震波碎石 ESWL 【醫學 2 樓 泌尿科檢查室】

TEL:2549

| | | | | | |
|------|-----|----|-------------|--------------|-------------|
| 科別代號 | 102 | 帳單 | OPD: 紙本 | 麻醉技術 計價方式 | OPD S53-122 |
| 房間查詢 | 260 | | IPD: 電腦自行上傳 | | IPD S53-121 |

碎石藥盒 (請注意有效期限) * 管制藥請自行領取

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------|----------------|
| Aminophyllin*1 | D/W*2 (for 稀釋 SCC) | NaHCO3*1 | Trandate*1 |
| Anectine*1 | Dexamethasone*2 | Nicardepine*1 | 2% Xylocaine*2 |
| Atropine*1 | Epherine*4 | NTG 舌下錠 | 交班本 |
| Ca*2 | Fentanyl* | Solu-medrol*1 | |

備物：聽診器& Handle & 借用 Blade*1



地理位置



震波碎石 注意事項

| | |
|------------------|---|
| 麻 評 | <p>病患看完門診後，若 NPO 時間足夠；可直接到麻醉評估室做麻評。完成麻評後；當天作碎石。若 NPO 時間不足；則到碎石室排程後返家，待手術日當天在前去麻評。</p> <p>*若麻醉同意書上非當日麻評主治醫師；則須拿到麻評室 co-sign</p> <p>*麻醉評估室分機：3062</p> |
| 麻 醉 前 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 依排程確認病患資料；交付麻醉同意書。 2. 確認藥物 & 備物完整。 3. 至碎石室先確認麻機開機 OK，網路連線 OK。 4. 自主檢測電擊器/天/次；將測試結果印出；貼在電擊器檢核表上。 5. 由檢查室護理人員執行靜脈滴注(on IV) |
| 麻 醉 中 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助病患躺在治療床上；依結石位置，採取不同臥位，平躺或俯臥。 2. 準備病患：ON EKG /SPO₂ /BP 。 3. 執行電子病歷連線。 4. 待放射科人員確認結石部位後，即可依醫囑給藥(Fentanyl 0.5ml IV；年輕人可給到 1ml IV)。 5. 全程採 IVG，不須使用 simple mask；須留意 SpO₂ 維持在 95%以上。 6. 碎石時間約 30 分鐘；約 3000 次震擊。 7. 須完成電子紀錄及病患基本資料登錄。入手術室~出手術室時間皆由麻醉人員 Key in。 |
| 麻 醉 結 束 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 治療結束後；協助病患離開治療床，須留意病人是否出現姿位性低血壓。 2. 陪同病患步行到沙發區休息 3. 點滴留置至恢復室，由檢查室人員拔除。 4. 門診病患採紙本帳單夾病歷交給檢查室人員；返家前至櫃檯批價。住院病患採電子帳單自行上傳。 |
| 其 他 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 計價單一式一聯。 2. 管制藥品單一式 2 聯。 3. 完成麻醉機檢查表及電擊器檢查表 4. 工作車點班；確認效期。 5. 空針放在座椅後方木櫃內；表單在抽屜裡。 |



ESWL



電擊車



執行麻醉監測



麻醉工作車