

頸部 胸部 雙腔導管注意事項



1. 第一天放置導管時，請注意有無滲血、腫脹、疼痛等情形；若有以上情形請告知護理人員，必要時可給予藥物使用。
2. 請隨時注意傷口有無紅、腫、熱、痛等感染情形或周圍腫脹、縫線（紗布）脫落等異常情形；若有以上情形請知會護理人員，或用紗布加壓後立即就醫治療。
3. 隨時注意傷口有無大量出血、管路外滑等異常情形；若有請知會護理人員，或用紗布加壓後立即就醫治療。
4. 請勿任意於傷口上塗抹痱子粉或不明藥膏。
5. 若因少量滲血、流汗或擦澡不慎弄濕傷口，請立即以無菌棉枝擦乾、優點消毒並更換敷料。
6. 請盡量穿著前排有扣或寬鬆上衣避免穿著套頭服裝，並記得穿脫衣物時，以先穿患側、先脫健側為原則，以避免管路牽扯。
7. 若因開始使用慶管而移除導管時，請記得以手加壓 10 - 20 分鐘，再以紗袋加壓 30 分鐘並觀察有無出血、腫脹等異常情形。
8. 導管拔除後之傷口，仍需注意癒合情形，於傷口未癒合前，仍需每日以優碘消毒傷口。



股靜脈 大腿 雙腔導管注意事項

1. 第一天放置導管時，請注意有無滲血、腫脹、疼痛等情形；若有以上情形請告知護理人員，必要時可給予藥物使用。
2. 請隨時注意傷口有無紅、腫、熱、痛等感染情形或周圍腫脹、縫線（紗布）脫落等異常情形；若有以上情形請知會護理人員，或用紗布加壓後立即就醫治療。
3. 隨時注意傷口有無大量出血、管路外滑等異常情形；若有請知會護理人員，或用紗布加壓後立即就醫治療。
4. 請勿任意於傷口上塗抹痱子粉或不明藥膏。
5. 若因少量滲血、更換尿布、流汗或擦澡不慎弄濕傷口，請立即以無菌棉枝擦乾、優點消毒並更換敷料。
6. 請盡量穿著寬鬆長（短）褲，避免大腿彎曲以減少管路折損影響功能或管路牽扯造成出血，並請記得穿脫衣物時，以先穿患側、先脫健側為原則，以避免管路牽扯。
7. 若因開始使用瘻管而移除導管時，請記得以手加壓 10 - 20 分鐘，再以砂袋加壓 30 分鐘並觀察有無出血、腫脹等異常情形。
8. 導管拔除後之傷口，仍需注意癒合情形，於傷口未癒合前，仍需每日以優碘消毒傷口。