林口長庚醫院自殺案件之月報表

2022 年 6 月

資料來源：自殺防治通報系統　　製表日期：2022.07.15

資料期：2022 年 6 月 1 日~ 6 月 30 日　製表單位：長庚醫院自殺防治中心

摘要：

★ 6 月總自殺案件為 43 人次。

★自殺人次，女性大於男性，發生率最高的年齡層為 15-24(34.9%)歲與 25-44 歲(34.9%)。

★自殺個案最常使用的自殺方式為 "安眠藥、鎮靜劑"(30.2%)。

★最多的自殺原因為”憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病”(62.8%)。

Table 1. 與去年同期自殺事件之性別、年齡分析比較

	2021.06		2022.06		Total	
	n=34	%	n=43	%	n=	%
性別						
女性	17	50.0	28	65.1	45	58.4
男性	17	50.0	15	34.9	32	41.6
年齡層	2021.06		2022.06		Total	
14 以下	0	0.0	2	4.7	2	2.6
15-24	11	32.4	15	34.9	26	33.8
25-44	14	41.2	15	34.9	29	37.7
45-64	8	23.5	8	18.6	16	20.8
65 以上	1	2.9	3	7.0	4	5.2

Table 2.自殺通報延遲分析

序號	ID	姓名	性別	年紀	通報日期	自殺日期	自殺方式	通報延遲天數/原因	
1	R122881***	蘇 O 貴	男	43	2022/06/04	2022/06/02	安眠藥鎮靜劑	1	端午連假到院
2	U220709***	鍾 O 玉	女	54	2022/06/08	2022/06/06	除安眠藥鎮靜劑之外藥物,燒炭	1	6/8 外院轉入
3	HD30666***	阮 OO 深	女	22	2022/06/08	2022/06/04	除安眠藥鎮靜劑之外藥物	3	假日到院
4	A123716***	許 O 宏	男	59	2022/06/06	2022/06/04	安眠藥鎮靜劑,自焚	1	假日到院
5	V221492***	賴 O 涵	女	27	2022/06/13	2022/06/11	安眠藥鎮靜劑,割腕	1	夜間到院

6	U221234***	吳O珍	女	42	2022/06/20	2022/06/18	高處跳下	1	夜間到院
7	H226081***	陳O樺	女	17	2022/06/28	2022/06/01	割腕	26	門診時才說自殺

Table 3. 2022年06月 自殺個案特徵分析

	女		男		Total	
	n=28	%	n=15	%	n=43	%
年齡層						
14以下	2	7.1	0	0.0	2	4.7
15-24	10	35.7	5	33.3	15	34.9
25-44	11	39.3	4	26.7	15	34.9
45-64	5	17.9	3	20.0	8	18.6
65以上	0	0.0	3	20.0	3	7.0
婚姻						
已婚	9	32.1	5	33.3	14	32.6
不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未婚	14	50.0	9	60.0	23	53.5
喪偶	0	0.0	0	0.0	0	0.0
離婚	5	17.9	1	6.7	6	14.0
教育程度						
國小	4	14.3	1	6.7	5	11.6
國中	6	21.4	4	26.7	10	23.3
高中	13	46.4	6	40.0	19	44.2
大專	3	10.7	0	0.0	3	7.0
碩士以上	1	3.6	1	6.7	2	4.7
不詳	1	3.6	3	20.0	4	9.3
職業						
不詳	4	14.3	3	20.0	7	16.3
失業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
全職	9	32.1	4	26.7	13	30.2
其他	0	0.0	0	0.0	0	0.0
家管	0	0.0	0	0.0	0	0.0
退休	0	0.0	3	20.0	3	7.0
無業	6	21.4	3	20.0	9	20.9
學生	9	32.1	2	13.3	11	25.6

Table 4. 與去年同期自殺方式之分析比較

	2021.06		2022.06	
	n=34	%	n=43	%
安眠藥鎮靜劑	13	38.2	13	30.2
除安眠藥鎮靜劑之外藥物	2	5.9	6	14.0
服用或施打毒品過量	0	0.0	0	0.0
一般農藥	2	5.9	1	2.3
巴拉刈	0	0.0	0	0.0
一般病媒殺蟲劑	0	0.0	1	2.3
化學物品	2	5.9	0	0.0
自焚	0	0.0	1	2.3
割腕	2	5.9	12	27.9
其他部位之切穿工具	2	5.9	2	4.7
上吊、自縊	1	2.9	1	2.3
悶死或窒息	0	0.0	1	2.3
燒炭	1	2.9	1	2.3
汽車廢氣	0	0.0	0	0.0
家用瓦斯中毒	0	0.0	0	0.0
其他氣體及蒸汽	0	0.0	0	0.0
臥、跳軌	0	0.0	0	0.0
撞擊	1	2.9	0	0.0
溺死（淹死）、跳水	0	0.0	0	0.0
高處跳下	10	29.4	8	18.6
以槍砲、氣槍及爆炸物	0	0.0	0	0.0
以其他方式	2	5.9	2	4.7
氦氣	0	0.0	0	0.0

Table 5. 2022.06 自殺方式之性別差異分析

	女		男		Total	
	n=28	%	n=15	%	n=43	%
安眠藥鎮靜劑	8	28.6	5	33.3	13	30.2
除安眠藥鎮靜劑之外藥物	5	17.9	1	6.7	6	14.0
服用或施打毒品過量	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般農藥	0	0.0	1	6.7	1	2.3
巴拉刈	0	0.0	0	0.0	0	0.0
一般病媒殺蟲劑	1	3.6	0	0.0	1	2.3
化學物品	0	0.0	0	0.0	0	0.0
自焚	0	0.0	1	6.7	1	2.3
割腕	9	32.1	3	20.0	12	27.9
其他部位之切穿工具	1	3.6	1	6.7	2	4.7
上吊、自縊	0	0.0	1	6.7	1	2.3
悶死或窒息	0	0.0	1	6.7	1	2.3
燒炭	1	3.6	0	0.0	1	2.3
汽車廢氣	0	0.0	0	0.0	0	0.0
家用瓦斯中毒	0	0.0	0	0.0	0	0.0
其他氣體及蒸汽	0	0.0	0	0.0	0	0.0
臥、跳軌	0	0.0	0	0.0	0	0.0
撞擊	0	0.0	0	0.0	0	0.0
溺死（淹死）、跳水	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高處跳下	6	21.4	2	13.3	8	18.6
以槍砲、氣槍及爆炸物	0	0.0	0	0.0	0	0.0
以其他方式	0	0.0	2	13.3	2	4.7
氦氣	0	0.0	0	0.0	0	0.0

Table 6. 與去年同期自殺原因之分析比較

	2021.06		2022.06	
	n=34	%	n=43	%
夫妻問題	2	5.9	4	9.3
家庭成員問題	3	8.8	4	9.3
感情因素	7	20.6	8	18.6
喪親、喪偶	0	0.0	1	2.3
憂鬱傾向、罹患憂鬱症	18	52.9	27	62.8
物質濫用(酒,藥,毒品)	1	2.9	1	2.3
職場工作壓力	2	5.9	2	4.7
失業	1	2.9	0	0.0
債務	2	5.9	0	0.0
慢性化疾病問題，如久病不癒	2	5.9	2	4.7
急性化疾病問題，如初知罹病	1	2.9	0	0.0
學校適應問題，如課業壓力	0	0.0	3	7.0
生涯規劃因素	0	0.0	0	0.0
遭受騷擾	0	0.0	0	0.0
遭受暴力	0	0.0	0	0.0
遭受詐騙	0	0.0	0	0.0
兵役問題	0	0.0	0	0.0
畏罪自殺	0	0.0	0	0.0
其他	1	2.9	2	4.7
個案(家屬)不願說明	3	8.8	1	2.3
個案因身體狀況無法說明	0	0.0	1	2.3
不詳	0	0.0	3	7.0

Table 7. 2022.06 自殺原因之性別差異分析

	女		男		Total	
	n=28	%	n=15		n=43	%
夫妻問題	3	10.7	1	6.7	4	9.3
家庭成員問題	3	10.7	1	6.7	4	9.3
感情因素	6	21.4	2	13.3	8	18.6
喪親、喪偶	0	0.0	1	6.7	1	2.3
憂鬱傾向、罹患憂鬱症	18	64.3	9	60.0	27	62.8
物質濫用(酒,藥,毒品)	0	0.0	1	6.7	1	2.3
職場工作壓力	0	0.0	2	13.3	2	4.7
失業	0	0.0	0	0.0	0	0.0
債務	0	0.0	0	0.0	0	0.0
慢性化疾病問題，如久病不癒	0	0.0	2	13.3	2	4.7
急性化疾病問題，如初知罹病	0	0.0	0	0.0	0	0.0
學校適應問題，如課業壓力	3	10.7	0	0.0	3	7.0
生涯規劃因素	0	0.0	0	0.0	0	0.0
遭受騷擾	0	0.0	0	0.0	0	0.0
遭受暴力	0	0.0	0	0.0	0	0.0
遭受詐騙	0	0.0	0	0.0	0	0.0
兵役問題	0	0.0	0	0.0	0	0.0
畏罪自殺	0	0.0	0	0.0	0	0.0
其他	2	7.1	0	0.0	2	4.7
個案(家屬)不願說明	0	0.0	1	6.7	1	2.3
個案因身體狀況無法說明	1	3.6	0	0.0	1	2.3
不詳	2	7.1	1	6.7	3	7.0

Table 8.院內自殺/自傷個案

無。